

**IMPORTANT - CARTE DE MISE EN GARDE
ABACAVIR/LAMIVUDINE ARROW comprimés
(abacavir / lamivudine)**

P1424826

Conservez cette carte sur vous en permanence.

ABACAVIR/LAMIVUDINE ARROW contient de l'abacavir. Certains patients prenant ABACAVIR/LAMIVUDINE ARROW peuvent donc développer une réaction d'hypersensibilité (réaction allergique grave) qui **peut menacer le pronostic vital** en cas de poursuite du traitement.

1/4

CONTACTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN qui vous indiquera si vous devez arrêter de prendre ABACAVIR/LAMIVUDINE ARROW 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé :

- 1) si vous présentez une éruption cutanée OU,
2) si vous présentez des symptômes appartenant à au moins DEUX des catégories suivantes :
- fièvre,
 - essoufflement, maux de gorge ou toux,
 - nausées ou vomissements ou diarrhée ou douleurs abdominales,
 - fatigue sévère ou courbatures ou sensation de malaise général.

2/4

Si vous avez arrêté le traitement par ABACAVIR/LAMIVUDINE ARROW en raison de cette réaction, **VOUS NE DEVEZ JAMAIS REPRENDRE** ABACAVIR/LAMIVUDINE ARROW, ni tout autre médicament contenant de l'abacavir (tel que Ziagen, Triumeq ou Trizivir) car cela peut entraîner, dans les heures qui suivent, une chute de votre pression artérielle menaçant le pronostic vital, voire le décès.

3/4

Contactez immédiatement votre médecin si vous suspectez une réaction d'hypersensibilité à ABACAVIR/LAMIVUDINE ARROW 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé. Veuillez indiquer ci-dessous les coordonnées de votre médecin :

Docteur : Tél :

En cas d'absence de celui-ci, veuillez contacter immédiatement un autre médecin pour un avis médical (par exemple : service des urgences de l'hôpital le plus proche).

Pour toute information générale concernant ABACAVIR/LAMIVUDINE ARROW, contactez : ARROW Génériques - Information médicale - Tél : 04.72.71.63.97

4/4

((Recto de la page))

((Intérieur de la carte - 1))

((Verso de la page))

((Intérieur de la carte - 2))